

Nuskausminamosioms tabletėms – galas.

Pristatome Jums Keshe Pain Pen skausmą malšinantį pieštuką.

Naudojantis plazmos technologijomis, kurios remiasi magnetinės gravitacijos lauko sąveika, Keshe pieštukas skleidžia virpesius, kurie prasiskverbia 3 centimetrus po mūsų oda ir padeda kūnui vėl pajusti balansą.

Keshe Pain Pen skausmą malšinantis pieštukas siūlo Jums natūraliu būdų panaikinti ar palengvinti stiprų ar net chronišką, ūminį skausmą. Pieštukas siunčia kontroliuojamus plazminio lauko impulsus nervais tiesiai į smegenis. Keshe Pain Pen Jums siūlo plazminės magnetinės – gravitacijos (Magravs) terapiją, kuri tinkama tiek jaunesniam, tiek vyresniam asmeniui.

Atnaujindamas savo paties plazminį Magravs lauką Keshe pieštukas yra labai patogus. Jame nėra nei judančių detalių, nei baterijų. Šios savybės paverčia jį itin lengvu, patvariu, universaliu ir patogiu visur nešiotis. Jis lengvai telpa ir į kišenę ir į piniginę, todėl juo naudotis netgi per drabužius galite visur ir visada.

The Keshe Pain Pen skausmą malšinantis pieštukas gali būti naudojamas :

- Sumažina raumenų skausmą, tendinitą, stiprų ar ūminį tendovaginitą.
- Pagerina kraujo cirkuliaciją.
- Padidina ląstelių audinių atsinaujinimą ir apdorojimą.
- Sumažina stiprius nugaros skausmus.
- Išlaiko stuburą ir nugarą normalioje pozicijoje.
- Sumažina patempimų skausmus.
- Sumažina riešo ir riešo kanalo sindromo sukeltus skausmus.
- Panaikina kelių skausmus.

Naudojimo instrukcija :

- 1) Laikyti virš pažeistų, skausmingų vietų po 30 – 40 sec. 5 kartus per dieną.
- 2) Rankomis nuplauti vandeniu (ne šiltesniu kaip 30° laipsnių temperatūros) ir muilu.

Saugojimo instrukcija :

- 1) Laikyti toliau nuo metalo.
- 2) Laikyti toliau nuo elektromagnetinių šaltinių (radijas, televizorius, kompiuteris, mobilusis telefonas ir pan.)
- 3) **Nerekomenduojama naudoti :**
 - Akims ir aplink jas.
 - Krutinės plote virš širdies.
 - Gerklės priekinėje dalyje.
 - Neurologinėje kaukolės dalyje (smegenys).
 - Vidaus organams.
 - Infekcijoms gydyti.
 - Karščiavimui gydyti.
 - Atviroms žaizdoms.
 - Nėščioms ar maitinančioms moterims.
 - Plotuose kur yra metalo ar elektrinių implantų prietaisai.
 - Širdies stimulatoriams.